

Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь 322 г



банка 322 г

- ккал 1488
- белок 60 г
- НЕ содержит глютен
- пищевые волокна 0 г

Разрешено для взрослых и детей с рождения

Наименование	На 100 г смеси
Энергия	100 ккал
Белки	4 г
Углеводы	12,2 г
Жиры	3,9 г
Витамин D	3,3 мкг
Витамин С	48,0 мг
Фолиевая к-та	123,0 мкг
Каротиноиды	0,82 мг

Информация для медицинских и фармацевтических сотрудников

Пример расчета суточной потребности продуктов лечебного питания для пациента с муковисцидозом*

Пациент Н., 2 года

Согласно российским клиническим рекомендациям по МВ примерное кол-во необходимых дополнительных калорий¹:

- 2 года — 200 ккал.

НутриниДринк с пищевыми волокнами

0,5 бутылки — 100 мл — 153 ккал
Белки — 9 %, жиры — 40 %, углеводы — 49 %



Ликвиджен

2 чайные ложки — 10 мл — 45 ккал
Жиры — 100 %



* Расчет продуктов лечебного питания для пациента производится индивидуально после консультации со специалистом здравоохранения.

Лечебный продукт Ликвиджен+ необходимо добавлять в готовую пищу, постепенно наращивая терапевтическую дозу. Адаптировано:

¹ Клинические рекомендации. Кистозный фиброз (муковисцидоз) у детей. Министерство Здравоохранения Российской Федерации. 2016 г.

² ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition. 35 (2016). P. 557-577.

Продукт НутриниДринк с пищевыми волокнами. СГР KZ.16.01.79.005.E.004171.03.15 от 18.03.2015.

Продукт Ликвиджен+. СГР RU.77.99.32.005.E.001077.03.17 от 07.03.2017.

Продукт Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь. СГР RU.77.99.19.004.E.001399.03.16 от 29.03.2016.

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО ДИЕТОТЕРАПИИ



Пациентам с муковисцидозом необходима ранняя нутритивная поддержка. Установлена непосредственная связь между состоянием питания и функцией легких¹

ПАЦИЕНТЫ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НУЖДАЮТСЯ В ПОВЫШЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ БЕЛКОВ И ЖИРОВ¹:

ПРИЧИНЫ

Недостаточное усвоение питательных веществ вследствие нарушений расщепления пищи (мальдигестия), нарушений всасывания (мальабсорбции).

Увеличение распада (катаболизма) белков при легочных обострениях.

Нарушение всасывания жиров (наиболее «плотных» энергоносителей).

Уменьшение квоты жира — отрицательное влияние на газообмен в легких.

Возможность высокого потребления белка и энергии обеспечивается адекватной заместительной диетотерапией.

Распределение потребности в калориях у детей с муковисцидозом^{1,2}:

- 35-40% — жиры
- 15-20% — белки
- 40-45% — углеводы



Потребность в калориях у детей с МВ должна быть повышена до 120–200 % по сравнению с теоретическими расчетами на фактический вес, в зависимости от возраста и нутритивного статуса больного^{1,2}.

В повседневной практике можно пользоваться следующими ориентирами в дополнительных калориях¹:

- 1-2 года — 200 ккал,
- 3-5 лет — 400 ккал,
- 6-11 лет — 600 ккал,
- старше 12 лет — 800 ккал в сутки.

Лечебное питание компании Нутриция позволяет подобрать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов для пациентов с муковисцидозом

НутриниДринк с пищевыми волокнами, 200 мл



Наименование	На 100 г смеси
Энергия	153 ккал
Белки	3,4 г
Углеводы	18,8 г
Жиры	6,8 г
Пищевые волокна	1,5 г
Натрий	67,0 мг
Калий	140,0 мг
Хлориды	100,0 мг
Кальций	84 мг

Ликвиджен+, 250 мл



Наименование	На 100 г смеси
Энергия	450 ккал
Белки	0
Углеводы	0
Жиры	50,0 г
Среднецепочечные ТГ	96%
Натрий	5,0 мг
Калий	0,1 мг
Хлориды	0,1 мг
Кальций	0,3 мг